

## University of Groningen

### Onderarmfracturen bij kinderen

Reinking, Johan Willem

**IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.**

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1968

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Reinking, J. W. (1968). *Onderarmfracturen bij kinderen*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*

## STELLINGEN

### I.

Spontane correcties van hoekstanden vereenvoudigen de behandeling van onderarmfracturen bij kinderen in hoge mate.

### II.

De refractuur is een kenmerkende complicatie van de onderarmfractuur bij het kind.

### III.

Een gebroken onderarm bij een kind zal zelden operatief moeten worden behandeld.

### IV.

Vooral bij kinderen dient men zich te realiseren, dat bij het routine onderzoek van de urine door papierstrookjes, geïmpregneerd met glucose enzymen, niet de totale reductie van de urine wordt nagegaan.

### V.

De hydrocèle testis bij een volwassene dient te worden geopereerd op de door Lord beschreven methode.

### VI.

De multiplicitéit van hersenmetastasen correleert met de multiplicitéit elders in het lichaam.

### VII.

Een grote bloeding uit het proximale gedeelte van de tractus digestivus moet door internist en chirurg gezamenlijk worden behandeld.

### VIII.

De patiënt, die een traumatische amputatie van een vingertop heeft opgelopen, moet het afgesneden deel van de vinger meebrengen naar de chirurgische polikliniek.

### IX.

Ampicilline in poedervorm voorkomt wondinfectie, wanneer dit in de operatiewond wordt gebracht bij de chirurgie van de dikke darm.

### X.

Bij het vinden van een stenoserende ringvormige ulceratie in de dunne darm, moet men informeren naar het gebruik van enteric coated kaliumchloride praeparaten.

### XI.

Een gebroken mast van een zeilboot op zee brengt meer problemen met zich mee dan een gebroken onderarm bij een kind.